

Protocolo Fumigación de Lecherías

(1 o 2 Aplicaciones por semana).

Preparación de 1 Litro	
Agua: 900 ml	Agua: 950 ml
BELE-831: 100 ml	BEL-800: 50 ml
DWTB-800: 25 gr	

Ejemplo:

- Bomba de espalda con 1.8 L de agua + 200 ml de BELE-831 + 50 gr de DWTB-800.
- Bomba de espalda con 1.8 L de agua + 100 ml de BEL-800.

Para Terneros

(Control de diarreas y fortalecimiento orgánico).

Dosis: Aplicar 10 cc por día durante 10 días.

Preparación de 1 Litro	
Agua: 900 ml	Agua: 950 ml
BELE-831: 100 ml	BEL-800: 50 ml
DWTB-800: 25 gr	

Aditivo para Alimento

Protocolo # 1	Protocolo # 2
BELE-831: 10 ml/ vaca/ día	BEL-800: 3.5 ml /vaca /día
DWTB-800: 1.5 gr/ vaca/ día	

Semana # 1: 50 % dosis

Semana # 2 en adelante: 100 % dosis

Instrucciones: Diluir la dosis recomendada en mínimo 50 ml de agua.

Ejemplo Protocolo # 1:

# Vacas	5	10	20	30	40	50
BELE-831 (ml)	50	100	200	300	400	500
DWTB-800 (gr)	7.5	15	30	45	60	75
Agua (ml)	200	400	800	1200	1600	2000
Total (ml)	250	500	1000	1500	2000	2500
Dosis/Vaca (ml)	50	50	50	50	50	50

Ejemplo Protocolo # 2:

# Vacas	5	10	20	30	40	50
BEL-800 (ml)	17.5	35	70	105	140	175
Agua (ml)	232.5	465	930	1,395	1,860	2,325
Total (ml)	250	500	1,000	1,500	2000	2,500
Dosis/Vaca (ml)	50	50	50	50	50	50