

Fumigación de Fosas (4 m x 10 m)

(2 Aplicaciones por semana)

Dosis Correctiva	Dosis Mantenimiento
Preparación de 1 Litro	Preparación de 1 Litro
Agua: 950 ml	Agua: 975 ml
BEL-800: 50 ml	BEL-800: 25 ml

Ejemplo:

- Dosis Correctiva:** Bomba de espalda con 2.85 L de agua + 150 ml de BEL-800.
- Dosis Mantenimiento:** Bomba de espalda con 2.925 L de agua + 75ml de BEL-800.

Recomendaciones:

- Este producto no se debe activar ni replicar. Solamente se disuelve según la recomendación.
- Cada aplicación se debe preparar en el momento, no dejar producto diluido para aplicaciones en días posteriores.

Fumigación de Cuita (30.000 gallinas)

Dosis: 200 ml de BELE-831 / Tonelada de Cuita.

Aplicación:

1. Calcular la cantidad de cuita que se va a sacar de acuerdo a la cantidad de días que se ha acumulado (ver tabla).
2. Aplicarle la dosis recomendada, según la cantidad de cuita, de manera uniforme logrando el mayor área de contacto posible. Se debe disolver el producto en agua para lograr mayor área de contacto.
3. Ya con el producto aplicado, se saca la cuita y se cubre con plástico.

Recomendación: Si se va a acumular cuita por varias semanas debajo de la jaulas.

- Se puede hacer 1 aplicación semanal de BELE-831 de acuerdo al estimado según la tabla. Se obtienen mejores resultados y el producto se va distribuyendo mejor.

Tabla para calcular la cantidad de cuita acumulada y la dosificación de BELE-831.

Semanas	-	1	2	3	4	5	6	7
Días	1	7	14	21	28	35	42	49
Ton	3	21	42	63	84	105	126	147
BELE-831	600 ml	4.2 L	8.4 L	12.6 L	16.8 L	21 L	25.2 L	29.4